

## Beiträge zur Flora

DER

## ELBURSGEBIRGE NORD-PERSIENS

VON

J. BORNMÜLLER, Weimar.

---

 Avec planche VIII.
 

---

(Suite et fin.)

**Bartramiaceæ.**

*Philonotis calcarea* (Br. eur.) Schimp. — Schiffn. II, n° 66. — Demawend, in valle Lar, 2600 m. (n° 5893); Tacht Soleiman, Piastschal, 35-3600 m. (5906).

**Fontinalaceæ.**

*Fontinalis antipyretica* L. — Schiffn. I, n° 37. — Teheran, ad basin m. Schimran, 1500 m. (n° 4477).

**Cryphæaceæ.**

*Leucodon immersus* Lindb. — Schiffn. I, n° 38; II, n° 70. — Enseli, pr. Kasian (n° 5839); in fruticetis ad mare (n° 5830, 5830 b); Rescht (n° 4460).

**Neckeraceæ.**

*Neckera complanata* (L.) Hüben. — Schiffn. II, n° 71. — Enseli, (1866 1867) Mianposchte (5853).

**Neckera Besseri** (Lob.) Jur. — Schiffn. II, n° 72. — Enseli, Mianposchte (n° 5847, 5880); Sefidrud, pr. Rudbar, 3-400 m. (n° 5888). — In foliis præsertim perichætialibus copiose: *Synchytriopsis muscicola* (Reinsch.) Schiffn.

**Leskea laxiramea** Schiffn. (spec. nov.) — Schiffn. II, n° 74; tab. IX, fig. 55—60. — Sefidrud, pr. Rudbar, 300 m. (n° 5887).

**Anomodon attenuatus** (Scheb.) Hüb.\* — Schiffn. II, n° 75. — Sefidrud, supra Rudbar, 6-700 m. (n° 5886).

**Anomodon viticulosus** (L.) Hook. et Tayl. — Schiffn. II, n° 76. — Enseli, Mianposchte (5857b).

## Hypnaceæ.

**Homalothecium sericeum** (L.) Br. eur. — Schiffn. I, n° 79. — Rescht (n° 4470 et 5875).

**Camptothecium lutescens** (Huds.) Br. eur. — Schiffn. II, n° 80. — Rudbar, 300 (n° 5887).

**Brachythecium Olympicum** Jur. — Schiffn. II, n° 82. — Inter Asadbar et Gerab, ad Gerdene-Bari, 29-3000 m. (n° 5894).

**Brachythecium rutabulum** (L.) Br. eur. — Schiffn. I, n° 42; II, n° 83. — Enseli, Kasian (n° 5838); Rescht (n° 4475, 4476). — Forma! (Schiffn. II, 83). — Enseli (n° 5828, 5829).

Var. **meridionale** Schiffn. II, n° 84. — Enseli, Kasian (n° 5830b); Mianposchte (5848). — Rescht (n° 5868).

**Scleropodium purum** (L.) Limpr. — Schiffn. II, n° 85. — Enseli (n° 5834).

**Eurhynchium Stokesii** (Turn.) Br. eur. — Schiffn. I, n° 44. — Rescht (n° 4467).

**Eurhynchium circinatum** (Brid.) Br. eur. var. **tenue** Brizi. — Schiffn. II, n° 86. — Rescht (n° 5871).

**Eurhynchium euchloron** (Bruch) Jur. et Milde. — Schiffn. I, n° 45; II, 87. — Rescht (n° 5870, 4465, 4469, 4473); Enseli, Mianposchte (n° 5851, 5856) et Kasian (n° 5837).

\* *Anomodon attenuatus* und *A. viticulosus* bezeichnet Herr Prof. Schiffner durch fetten Druck als neu für Persien; beide Arten werden schon von *Buhse* (in Aufz. Reise Transkauk. und Persien, Seite 235, als *Leskea* 236) von Asterabad angegeben. Auch *Pterogonium gracile* Sw. (vergl. Schiffn. II, n° 77.) wird bereits von *Geheeb* in « Beitr. zur Moosflora von Syrien » (in Allg. Bot. Zeitschr. 1902 n° 3-4) als « neuer Bürger der asiatischen Moosflora » aus der Umgebung von Beirut verzeichnet. Uebrigens ist letztgenannte Art in den Gebirgen des westlichen Kleinasiens (Smyrna) ausserordentlich häufig, ein Beweis, wie wenig bisher in jenen Gebieten die Moosflora Beachtung fand.

**Eurhynchium Swartzii** (Turn.) Curn. — Schiffn. II, n° 89. — Enseli, Mianposchte (n° 5885).

Var. **meridionale** Warnst. — Schiffn. II, n° 90. — Enseli, Mianposchte (n° 5845).

**Eurhynchium speciosum** (Brid.) Milde. — Schiffn. II, n° 91. — Enseli (n° 5826).

**Thamnium alopecurum** (L.) Br. eur. — Schiffn. I, n° 43. — Rescht (n° 4463, 4464).

Var. **corticolum** Schiffn. (var. nov.). — Schiffn. II, n° 92. — Enseli, Mianposchte (n° 5852).

**Rhynchostegiella Jacquinii** (Garov.) Limpr. var. **Persica** Schiffn. (nov. var.) — Schiffn. II, n° 93. — Enseli, Mianposchte (n° 5846).

**Rhynchostegium megapolitanum** (Bland.) Br. europ. — Schiffn. II, n° 95. — Enseli, Kasian (n° 5836).

**Amblystegium Kochii** Br. eur. — Schiffn. II, n° 96. — Enseli (n° 5826).

**Hypnum decipiens** (De Not.) Limpr. var. **napæiforme** Schiffn. (nov. var.). — Schiffn. II, n° 99. — Tachtü Soleiman, ad nives prope Piastschal, 36-3700 m. (n° 5909, 5910).

**Hypnum falcatum** Brid. — Schiffn. II, n° 100. — Distr. Talkan, supra Norion 2600 m. (n° 5912).

**Hypnum cupressiforme** L. — Schiffn. I, n° 52. — Rescht (n° 4461).

Var. **tectorum** Br. eur. — Schiffn. II, n. 102. — Enseli (n° 5841, 5842).

**Hypnum Vaucheri** Lesq. — Schiffn. II, n° 103. — In valle Lar, ad Meidanek, 2200 m. (n° 5889).

**Acrocladium cuspidatum** (L.) Lindb. — Schiffn. I, n° 48 (*Hypnum cuspidatum* L.) II, n° 104. — Enseli, Mianposchte (n° 5858), Kasian (n° 5827), Rescht (n° 4461, 5869).

## Fungi.

Die Bestimmung der Pilze verdanke ich zum grössten Teil Herrn Prof. *Magnus*, welcher auch die von ihm übernommenen Nummern eingehender behandeln und veröffentlichen wird. Ich begnüge mich daher, im Anschluss an die Aufzählung meiner anderen Sammlungen die Pilze nur in systematischer Anordnung ihrer Nährpflanzen hier anzuführen. Einen anderen Teil der hier gemeinsam aufgezählten Pilze hatten die Herren *H. und P. Sydow* bestimmt und darüber eine Abhandlung in « *Annales Mycologici* » (Vol. VI, n° 1, 1908, p. 17-18), betitelt « *Einige neue von Herrn J. Bornmüller in Persien gesammelte Pilze* », veröffentlicht. — Alle Bestimmungen, soweit sie nicht *Sydow'sche* Species sind und soweit nicht « *determ. Sydow* » beibemerkt ist, rühren von Herrn Prof. *Magnus* her.

## Berberidaceæ, Cruciferæ, Silenaceæ.

*Berberis integerrima* Bge  $\beta$  *densiflora* (Boiss. et Buhse) Schneid. : **Æcidium Haussknechtianum** P. Henn. — Elburs, pr. Egil, 1900 m. s. m. (11. VII. 1902; n° 5732). — **Puccinia graminis** (Pers.) (*Uredo*). — Totschal, Scheheristanek, 2200 m. s. m. (12. VI. 1902; n° 5733).

*Hirschfeldia incana* (L.) Heldr. ; **Albugo candida** (Pers.) O. Ktze. — Ad Baku Transcaucasæ (19. V. 1902; n° 5729).

*Dianthus Persicus* Hausskn. : **Uromyces caryophyllinus** (Schrank) Wint. — Elburs occid., Dschoistan in valle Talkan, 2100 m. s. m. (27. VI. 1902; n° 5735).

*Acanthophyllum crassifolium* Boiss. : **Erysiphe Taurica** Lév. — Prope Ahar et Egil, 2200 m. s. m. (11. VII. 1902; n° 5739).

*Melandrium album* (L.) Grcke. : **Uromyces Schrœteri** De Toni. — Enseli, in insula Mianposchte (23. IV. 1902; n° 5734).

## Papilionaceæ, Rosaceæ, Pomaceæ.

*Medicago sativa* L. : **Pseudopeziza Trifolii** (Bernh.) Fuckel f. **Medicaginis** (Lib.) Rehm. — Totschal, Scheheristanek 2200 m. s. m. (12. VI. 1902; n° 5742).

*Glycyrrhiza glabra* L.  $\gamma$  *glandulifera* (W. K.) Reg. et Herd. : **Uromyces Glycyrrhizæ** (Rabh.) Magnus. — Inter Mendschil et Patschinar, 500 m. s. m. (11. V. 1902; n° 5741) et inter Teheran et oppidum Demawend, ad fluvium Dschadsche-rud, 1400 m. s. m. (20. VII. 1902; n° 5705).

*Astragalus remotijugus* Boiss. : **Uromyces Persicus** Sydow, **spec. nov.** (in Ann. Mycolog. vol. VI, p. 17; 1908). — Elburs occid., ad pagum Getschesâr vallis Lur, 2200 m. s. m. (18. VI. 1902; n° 5724).

*Astragalus chrysanthus* Boiss. et Hohenack. : **Æcidium spec. et Pleospora herbarum** (Pers.) Rabh. (determ. Sydow). — In regione alpina alpium Totschal (Schimran), 2800 m. s. m. (11. VI. 1902; n° 5744).

*Pisum formosum* (Stev.) Boiss. : **Æcidium Pisi-formosi** Sydow, **spec. nov.** l. c. p. 18. — In glareosis alpinis montium Totschal (Schimran), 2400 m. s. m. (10. VI. 1902; n° 5743).

*Lathyrus roseus* Stev. : **Diachora Onobrychidis** Sacc. (Spermog. : *Placosphæra Onobrychidis* Sacc.) — In Caucaso, prope Mleti, 1800 m. s. m. (10. VIII. 1902; n° 5788).

*Hulthemia Persica* (Mchx., 1786) Stapf. (= *H. berberifolia* Pall., 1797) : **Sphærotheca** prob. **spec. nov.** (Magnus). — Kaswin, in collibus et desertis, 1300 m. s. m. (16. V. 1902; n° 5760).

*Geum Kokanicum* Reg. et Schmalh. : **Phragmidium circumvallatum** P. Magnus (*Cæoma*). — Alpes Totschal (Schimran), in regionis alpinæ jugo Lâdd, 2400-3000 m. s. m. (11. VI. 1902; n° 5749).

*Mespilus Germanica* L. : **Gymnosporangium confusum** Plowr. — Ad pedem montis Demawend in hortis pagi René, 2050 m. s. m. (16. VIII. 1902; n° 5748).

Umbelliferæ, Rubiaceæ. Dipsaceæ.

*Pimpinella Tragium* Vill. : **Puccinia Pimpinellæ** (Strauss) Mart. — Totschal, in valle ad Scheheristanek, 2200 m. s. m. (11. VI. 1902; n° 5756).

*Chærophyllum macropodum* Boiss. : **Puccinia chærophyllina** Sydow spec. nov. (in Ann. Mycol. vol. VI. p. 17; 1908). — Alpium Totschal ad latus septentrionale supra Scheheristanek, 2700 m. s. m. (11. VI. 1902; n° 5753).

*Chærophyllum macropodum* Boiss. : **Puccinia distinguenda** Sydow, spec. nov. (in litt. 23. IX. 1908). — Inter Rescht et Kaswin in latere meridionali montis Charsan, prope Mesrà, 1800 m. s. m. (13. V. 1902; n° 5752). — Alpium Totschal ad latus meridionale supra pagum Ferasad, 2000 m. s. m. (29. V. 1902; n° 5751). — In districtu Talkan (Talagon), ad pagum Gattadeh, 2400 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5716). (Meine Exsiccaten der Nummern 5752, 5751, 5716 tragen die Magnus'sche Bestimmung «*Puccinia Chærophylli* Purt. »).

*Diplotænia cachrydifolia* Boiss. : **Pleospora Persica** Sydow, spec. nov. (Ann. mycol. vol. VI. p. 18; 1908). — Elburs occid., ad Jaïla Assalek, inter Asadbar et Gerab, 2900 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5721).

*Prangos uloptera* DC. : **Puccinia plicata** Kom. — Alpes Totschal, in vallibus ad pagum Scheheristanek, 2300 m. s. m. (4. VI. 1902; n° 5755).

*Peucedanum Aucheri* Boiss. : **Puccinia bullata** Pers. forma! Alpes Totschal, ad latus septr. prope Scheheristanek, 2200 m. s. m. (9. VI. 1902; n° 5754).

*Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. : **Erysiphe Umbelliferarum** De By. — Extra fines Persiæ, ad As-chabad in monte Sundso-dagh ad Karakala (12. V. 1901 leg. *Sintenis*).

*Crucianella glauca* A. Rich.  $\beta$  *laxifolia* Boiss. : **Puccinia Crucianellæ** Desm.-Elburs occid., in valle Lur ad rupes, 2100 m. s. m. (9. VI. 1902; n° 5758).

*Scabiosa Palæstina* L. var. *calocephala* Boiss. : **Æcidium Scabiosæ** Dozy et Molk. — Kaswin, in incultis, 1250 m. s. m. (15. V. 1902; n° 5757).

Compositæ.

*Erigeron Khorassanicus* Boiss. : **Albugo Tragopogonis** (Pers.) Gray. — Elburs occid., inter Asadbar et Gerab, in valle Serd-derre, 2700 m. s. m. (26. VII. 1902; n° 5713).

*Achillea vermicularis* Trin. : **Puccinia Achilleæ** Ccke. — Elburs occid., in valle Talkan inter Deda et Gattadeh, 2400 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5715).

*Achilleæ Talagonica* Boiss. : **Puccinia Achilleæ** Ccke. — Elburs occid., in valle Lur, ad Getschesär, 2200 m. s. m. (4. VII. 1902; n° 5711). — In districtu Talkan (Talagon), prope Dschoistan, 2100 m. s. m. (27. VI. 1902; n° 5762).

*Pyrethrum myriophyllum* C. A. Mey. γ. *eriocephalum* Boiss. : **Puccinia Pyrethri** Rabh. — Alpes Totschal, in vallibus ad Scheheristanek, 2200 m. s. m. (10. VI. 1902; n° 5765).

*Echinops* spec. : **Puccinia pulvinata** Rabh. — Elburs occid., in valle Lur ad pagum Getschesär, 2200 m. s. m. (19. VI. 1902; n° 5726). — In subalpinis inter alpes Totschal et montem Demawend, ad pagum Egil, 1900 m. s. m. (11. VII. 1902; n° 5766).

*Thevenotula scabra* (Boiss.) O. Ktze. var. *Persica* (DC.) Bornm. (in Beih. z. Bot. Centralbl. XX, II. Abt. p. 158 (1906) = *Thevenotia Persica* DC. : **Erysiphe Taurica** Lév. — P. Magnus in « J. Bornmüller, Iter Pers-turc. 1892-93 » (Verh. d. Zool. Bot. Ges. Wien, 1899) p. 14. — Teheran, in incultis apricis, 1160 m. s. m. (1. II. 1892! n° 4370; pl. nutrix sub *Thevenotia scabra* Boiss.).

*Cousinia calocephala* Jaub. et Spach. = *C. squarrosa* Boiss. (Bornm. in Bull. Herb. Boiss. 2<sup>me</sup> sér., t. VII, 219; 1907) : **Puccinia Cousiniæ** Sydow (determ. *Magnus*). — Elburs occid., in valle Lur, ad pagum Getschesär, 2200 m. s. m. (4. VII. 1902; n° 5706).

*Carduus pycnocephalus* Jacq. γ *Arabicus* Boiss. : **Puccinia Cardui-pycnophali** Sydow. — Transcaucasia, in cultis ad Baku (19. IV. 1902; n° 5760 pp. sub *P. Carduorum* Jacky, sensu *P. Magnus*).

*Cirsium arvense* (L.) Scop. : **Puccinia suaveolens** (Pers.) Rostr. — Elburs occid., in subalpinis vallis Lur, ad Getschesär, 2200 m. s. m. (19. VI. 1902; n° 5720).

*Serratula latifolia* Boiss. : **Puccinia Serratulæ-oligocephalæ** Sydow, 1904. — Elburs occident., in subalpinis vallis Lur ad pagum Getschesär, 2200 m. s. m. (20. VI. 1902; n° 5718). — Determ. *Sydow*.

*Jurinea heterophylla* Jaub. et Spach : **Puccinia Jurineæ** Cooke (syn. *P. Wettsteinii* De Toni, teste cl. *Sydow*). — Elburs occident., in districtu Talkan (Talagon) ad pagum Dschoistan, 2100 m. s. m. (28. VI. 1902; n° 5708).

*Phæopappus Aucheri* (DC.) Boiss. Diagn. (= *Ph. leuzeoides* Boiss. fl. Or. III, 597) var. *Szovitsii* Boiss. : **Puccinia Persica** Wettst. (determ. *Sydow*). — Elburs, inter alpes Totschal et Demawend ad Schekerabad (supra Ahar), 2400 m. s. m. (10. VII. 1902; n° 5702).

*Phæopappus Aucheri* (DC.) Boiss. var. *integrifolia* Boiss. : **Puccinia Persica** Wettst. (determ. *Sydow*). — Elburs occid., districtus Talkan, in valle supra Dschoistan ad pagum Schikan, 2300 m. s. m. (28. VI. 1902; n° 5767).

*Centaurea Behen* L. : **Puccinia Centaureæ** Mart. — Inter Demawend et alpes Totschal, supra Feschend, 2000 m. s. m. (12. VII. 1902; n° 5768).

*Picris strigosa* M. B. : **Puccinia Picridis** Hazsl. — Elburs occident., in valle Lur, 2200 m. s. m. (18. VI. 1902; n° 5723); determ. *Diedicke*.

*Tragopogon crocifolius* L. : **Albugo Tragopogonis** (Pers.) Gray. — Alpium Totschal ad pedem septentr. prope Scheheristanek, 2200 m. s. m. (21. VI. 1902; n° 5761).

*Scorzonera mollis* M. B. var. *flaviflora* Bornm. (Bull. Herb. Boiss. 1907, p. 431) : **Puccinia Scorzoneræ** (Schum.) Jacky. — Inter Rescht et Kaswin, in jugo Charsan, 2200 m. s. m. (12. V. 1902; n° 5759, *Æcidium*; det. Sydow).

*Scorzonera calyculata* Boiss. : **Puccinia Scorzoneræ** (Schum.) Jacky. — Elburs occid., in trajectu alpino inter Asadbar et Getschesär, 3000 m. s. m. (26. VI. 1902; n° 5709; det. Sydow).

*Scorzonera calyculata* Boiss.  $\beta$  *integrifolia* Bornm. (l. c. p. 431) : **Puccinia Scorzoneræ** (Schum.) Jacky. — Ad radices montis Demawend prope Pelur, 2200 m. s. m. (16. VII. 1902; n° 5703, det. Sydow).

*Taraxacum montanum* (C. A. Mey.) DC. : **Puccinia decipiens** Mass. (determ. Sydow). — Alpium Totschal ad radices septentr. prope Scheheristanek, 2200 m. s. m. (7. VI. 1902; n° 5764). — In valle Lur, ad Getschesär, 2200 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5707, det. Magnus).

*Taraxacum Syriacum* Boiss. (= *T. denudatum* Boiss.) : **Puccinia decipiens** Mass. (det. Magnus) -- Elburs occident., districtus Talkan, inter Deda et Gattadeh, 2400 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5714).

*Taraxacum parvulum* (Wall.) DC. : **Puccinia Taraxaci-bithynici** Maire. — In alpiibus Totschal, 2700 m. s. m. (11. VI. 1902; n° 5763; déterm. Sydow).

#### Borraginaceæ, Labiatæ.

*Nonnea pulla* (L.) DC. : **Erysiphe horridula** Lév. (*Oidium*). — Elburs occid., in alpinis inter Asadbar et Gerab, 2700 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5726).

*Thymus Kotschyanus* Boiss. et Hohen. : **Puccinia Epithymum** P. Magnus **spec. nov.** (indescr.) — Elburs occident., in valle Lur ad Getschesär, 2200 m. s. m. (18. VI. 1902; n° 5728).

*Nepeta teucriifolia* Willd. : **Septoria Bornmülleri** Sydow. **spec. nov.** (Ann. Mycol. vol. VI, p. 18). — Alpium Totschal in valle ad Scheheristanek, 2200 m. s. m. (10. VI. 1902; n° 5770).

*Stachys setifera* C. A. Mey. : **Puccinia Harioti** Lagerh. — Elburs occident., ad pagum Norion in subalpinis, 2600 m. s. m. (30. VI. 1902; n° 5787).

*Eremostachys laciniata* L. : **Puccinia Phlomidis** Thuem. (determ. Sydow). — Alpium Totschal ad radices septentr. prope pagum Scheheristanek, 2200 m. s. m. (2. VI. 1902; n° 5769).

#### Polygonaceæ, Aristolochiaceæ, Euphorbiaceæ.

*Rumex* spec. : **Puccinia Phragmitis** (Schum.) Koern. (*Æcidium* : *Æc. rubellum* Gmel.). — Enseli, in insula Mianposchte (23. IV. 1902; n° 5779). — In ruderalis ad Baku Transcaucasie (19. IV. 1902; n° 5778).

*Polygonum alpestre* C. A. Mey. : *Uromyces-Polygoni* (Pers.) Wint. — Ad basin montis Demawend in valle Lar. 2500 m. s. m. (14. VII. 1902; n° 5776) et inter Pelur et Rene. 2400 m. s. m. (15. VII. 1902; n° 5704).

*Aristolochia Maurorum* L.  $\beta$  *latifolia* Boiss. : *Æcidium Aristolochiæ* (DC.) Wint. — Kaswin. in vinetis, 1250 m. s. m. (18. V. 1902; n° 5777).

*Euphorbia Chamæsyce* L. : *Uromyces proëminens* DC.) Pass. — Inter Mendschit et Patschinar, 4-500 m. s. m. (11. V. 1902; n° 5784).

*Euphorbia megalantha* Boiss. : *Melampsora Helioscopiæ* (Pers.) Cast<sup>1</sup> — Kaswin, in vinetis, 1250 m. s. m. (18. V. 1902; n° 5772).

*Euphorbia falcata* L. : *Melampsora Helioscopiæ* (Pers.) Cast. — In jugo Charsan inter Patschinar et Kaswin. 1200 m. s. m. (13. V. 1902; n° 5784b).

*Euphorbia decipiens* Boiss. et Bushe  $\beta$  *major* Boiss. (= *E. polycaula* Boiss.) : *Uromyces scutellatus* (Schrank) Lév. — Elburs occident., inter Asabdar et Getschesär in jugo alpino, 2600 m. s. m. (26. VI. 1902; n° 5710).

*Euphorbia cheiradenia* Boiss. et Hoh. : *Uromyces scutellatus* (Schrank) Lév. — In valle Lur montium Elburs occid., ad pagum Getschesär, 2200 m. s. m. (VII. 1902; n° 5727). — *Æcidium Euphorbiæ* Gmel. — Ad basin septentr. alpium Totschal ad Scheheristanek, 2200 m. s. m. (13. VI. 1902; n° 5773; determ. Sydow).

*Euphorbia virgata* W. K. : *Melampsora Helioscopiæ* (Pers.) Cast. — Ad basin septentr. alpium Totschal, ad pagum Scheheristanek, 2200 m. s. m. (6. VII. 1902; n° 5775). — *Uromyces* spec. — Ad Scheheristanek, 2200 m. s. m. (7. VI. 1902; n° 5774).

*Euphorbia* spec. : *Melampsora Helioscopiæ* (Pers.) Cast. (determ. Sydow). — Ad Germabdar inter alpes Totschal et Demawend, c. 2000 m. s. m. (12. VII. 1902; n° 5771).

#### Graminaceæ.

*Andropogon Ischæmum* L. : *Ustilago Ischæmi* Fekl. — Elburs occident., in valle Lur ad pagum Getschesär, 2100 m. s. m. (VII. 1902; n° 5780) et in valle Talkan (Talagon) ad pagum Deda, 23-2400 m. s. m. (1. VII. 1902; n° 5712).

*Cynodon Dactylon* (L.) Pers. : *Puccinia Cynodontis* Desm. (determ. Sydow). — Euseli. in insula Mianposchte (23. IV. 1902; n° 5785).

#### *Polyporus versicolor* (L.) Fr.

Euseli. in silvis insulæ Mian-poschte (23. IV. 1902). — Prope Rescht (9. I. 1892).



## Nachträge und Berichtigungen.

In obiger Aufzählung meiner Ausbeute fanden, wenigstens in der zweiten Hälfte, auch eine Reihe gilanischer Pflanzen Aufnahme, welche der unlängst verstorbene russische Botaniker *Th. Alexeenko* im Juli des gleichen Jahres (1902) auf einer Reise vom Kaspisee nach den Persischen Golf gesammelt hatte und die ich der Freundlichkeit Herrn Director Dr *Litwinows* (St. Petersburg) verdanke. Da *Alexeenko* die Tour von Rescht nach Kaswin über Lahidschan-Lengerud, also durch das Gebirge östlich vom Dschulfek-Kuh, nahm, so sind manche besonders wertvolle Spezies darunter zu verzeichnen. Eine Reihe dieser Funde, die Ranunculaceen bis Dipsaceen betreffend, sind daher, soweit ich Exemplare erhalten hatte, hier nachträglich nach anzuführen. — Ferner wird im Folgenden auf einige Namensänderungen hingewiesen, die sich aus den Wiener Nomenclatur-Regeln d. J. 1905 ergaben, ohne diesbezüglich auch nur annähernd Anspruch auf Vollständigkeit machen zu wollen. Schliesslich sind etlich Irrtümer und besonders störende Druckfehler zu berichtigen.

**Tom. IV (1904) p. 1087 (Sep. 6):** Im Gegensatz zu *Huth* (Rev. Ad., p. 64), *Halácsy* (Consp. fl. Græc. I, 7) u. A., welche *Adonis microcarpa* DC. Syst. I, p. 223 (1818) mit *A. squarrosa* Stev. (1848) vereinigen und *A. microcarpa* Boiss. fl. Or. I, 18 als ein Synonym der *A. Cupaniana* Guss. hinstellen, macht neuerdings *Hochreutiner* (in Ann. d. Conserv. et d. Jard. Botan. Genève, 7<sup>me</sup> et 8<sup>me</sup> années, 1904, p. 145-146) betreffs der *A. microcarpa* DC. folgende Aufstellung der Synonymik:

*A. dentata* Del. fl. Eg. t. 522 (1812) = *A. microcarpa* DC. Syst. I, 224 (1818) et syn.

α var. *orientalis* DC. Syst. I, 224 = *A. dentata* Del. sensu strict.

β var. *microcarpa* Hochr. = *A. microcarpa* DC. l. c. sensu strict.

Somit hat *A. squarrosa* Stev., die in meinen Beiträgen im Sinne *Huths* als Synonym der *A. microcarpa* DC. figurirt, als Art aufgefasst diesen Namen *Stevens* zu behalten. Im Sinne *Boissiers* und neuerdings auch *Hochreutiners* lässt sich *A. squarrosa* Stev. nur als eine Varietät der *A. æstivalis* L. ansshen und hat als solche zuheissen: *A. æstivalis* L. var. *provincialis* Hochr., (= *A. dentata* var. *provincialis* DC. Syst. I, 224 [1818] = *A. æstivalis* var. *squarrosa* Boiss. fl. Or. I, 18 [1867] = *A. æstivalis* var. *dentata* Cosson Comp. atl. II, 12 [1883-87; non = *A. dentata* Delile fl. Eg. 1812] = *A. squarrosa* Stev. in Bull. soc. Mosc. II, 272; 1848).

**IV, 1266 (Sep. 22):** *Erysimum cæspitosum* DC. γ *latifolium* Bornm. ist als *E. Elbursense* Boiss. zu bezeichnen, übereinstimmend mit *Hausknecht'schen* Exemplaren vom Kuh Schahu und Avroman.

**IV, 1263 (Sep. 23):** Statt *Sisymbrium Sinapistrum* Cr. (1769) lies *S. altissimum* L. (1753, ex p.; 1763 ex p.); cfr. Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 1907, p. 573.

**IV, 1266 (Sep. 26):** Die Notiz über die beiden *Sterigmotemon*-Arten ist zu streichen, da hier unter Schahrud nicht der Fluss in Gilan, sondern

die gleichnamige Stadt an der Ostgrenze Masanderans (in Astrabad) zu verstehen ist.

IV, 1267 (Sep. 27) : *Clastopus*. Vergl. Bornmüller in Fedde Repert. III (1906), p. 114-115. Die aus dem Gebiet angeführten Formen haben zu heissen : *C. erubescens* Hausskn. var.  $\beta$  *dichrous* Bornm. (vom Kendewan) mit f. *versicolor* Bornm. (vom Totschal) und var.  $\delta$  *stenophyllus* Bornm. (vom Charsan).

IV, 1271 (Sep. 31) : *Petrocallis fenestrata* Boiss. et et Hoh. Aus Samen gezogene Exemplare haben im Garten des Herrn Sündermann in Lindau geblüht; die Zugehörigkeit dieser Pflanze zur Gattung *Petrocallis* bleibt zweifelhaft.

Tom V (1905), 57 (Sep. 41) : Statt *Capparidæ*, *Cistineæ*, *Violariæ*, *Sileneæ* etc. etc. hat es zu heissen *Capparidaceæ*, *Cistaceæ*, *Violaceæ*, *Sileneæ* etc.

V. 59 (Sep. 43) : *Viola brachyantha* Stapf (und damit übereinstimmend die von mir im Sefidrud-tale gesammelte, als *V. Hymettia* Boiss. et Heldr. aufgeführte Pflanze) ist richtiger als eine Form mit etwas grösseren Blüten) von *V. Kitaibeliana* Roem. et Schull. anzusehen, eine Ansicht, die neuerdings auch W. Becker teilt.

V. 62 (Sep. 46) : Die von mir als *Gypsophila pallida* Stapf bestimmte und verzeichnete Pflanze von Kaswin gehört zu *G. polyclada* Fenzl. Echte *G. pallida* Stapf, nach dürftigen Exemplaren beschrieben (eine Probe davon einzusehen, verdanke ich der Direction des K. K. Botan. Instituts der Univer. Wien, besonders der Hilfe Herrn Dr. E. Janchens), ist mit *G. Haussknechtii* Boiss. identisch, gehört also gar nicht in die Verwandtschaft der *G. paniculata*, sondern in die Gruppe der *Suffruticosæ*. Da die *Stapf*sche Publikation (1886) der Veröffentlichung des Supplement-Bandes von Boiss. fl. Or. (1888) zuvorkam, hat *G. pallida* Stapf vor *G. Haussknechtii* Boiss. die Priorität erreicht. Auch die südpersischen Exemplare (Schiras; leg. *Stapf*) der in Boiss. fl. Or. als *G. Damascena* angeführten Pflanze gehören meines Erachtens zu *G. pallida* Stapf, während die von *Strauss* in westlichen Persien gesammelten, als *G. polyclada* Fenzl angesprochenen Exemplare sämtlich zu *G. pulchra* Stapf (Orig. !) gehören.

V. 62 (Sep. 46) : Bei *Gypsophila modesta* Bornm. ist auf Tafel VI, fig. 3 hinzuweisen.

V. 64 (Sep. 48) : Statt n° 6341 (auf Zeile 3) lies n° 6340. — N° 6340 sellt ein etwas grossköpfiges *Acanthophyllum microcephalum* Boiss., d. h. mit etwas grösseren Blütenknäulen (f. *majus* Bornm.) dar, wozu auch *Pichlers* Pflanze von Hamadan, die *Stapf* (in Polak. Exped.) als *A. mucronatum* bestimmte, gehört; n° 6341. aus dem gleichen Gebirgstal, ist typisches *A. crassifolium* Boiss. Typisches *A. microcephalum* Boiss. traf *Alexeenko* im Gebiet des Elburs » in siccis prope Kilischim » (n° 340, indetermin.) und « ad rupes supra Kagostan » (n° 458, indetermin.) an.

V. 119 (Sep. 51) Zeile 18 : Statt 1892 lies 1902. — Statt *Silene commelinæfolia* und (p. 53) *S. swertiæfolia* etc. ist besser *S. commelinifolia* und *S. swertiifolia* zu schreiben.

V. 122 (Sep. 54) : *Buffonia Oliveriana* Ser. Zu den Synonymen dieser Art gehört nach Vergleich mit Original-exemplaren auch *B. arcuata* Stapf (Polak.-Exp. II, 18; 1886). Eine Verschiedenheit der Griffellänge

bestätigt sich an diesen Exemplaren gegenüber der Teheraner Pflanze (also vom klass Standort der *B. Oliveriana*!) nicht.

V. 123 (Sep. 55): Nach Einsicht der vom Bot. Institut in Wien erhaltenen Original-Exemplare von *Alsine Wiesneri* Stapf und *A. Rudbarensis* Stapf bestätigt sich meine Vermutung, dass erstere zu *A. montana* (Læfl.) Fenzl.  $\beta$  *Caucasica* Boiss. gehört. Der Bogen von *A. Rudbarensis* Stapf enthält dagegen *A. brevis* Boiss. und *A. sclerantha* F. et M. — Als Autor von *A. montana* hat Fenzl. nicht Willk., zu stehen.

V. 124 (Sep. 56): Die als *Alsine tenuifolia* « var. *Lydia* » bezeichnete Pflanze gehört noch zu var. *viscosa* (Schreb. pr. sp.). Die westanatolische, von mir neuerdings zahlreich bei Smyrna angetroffene echte var. *Lydia* Boiss. ist davon weit verschieden und besser als eigene Art zu betrachten (*A. Lydia* Boiss. Diagn.).

V. 128 (Sep. 60): Nach Litwinow pl. Turcom. II (1907), p. 17 ist *Herniaria glabra* L. schon von Kotschy im Elburs « in fauce Dudera » gesammelt; ebenso bleibt in Boiss. fl. Or. *Pteranthus echinatus* Desf. von Kotschy bei Ask gesammelt, unerwähnt; beide also nicht neu für das Gebiet.

V. 130 (Sep. 62) zu ergänzen: *Hypericum hyssopifolium* Vill. var. *elongatum* (Led.) Boiss. — Prope Diardschan, in clivis calcareis inter frutices (21, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 302, indetermin.).

V. 132 (Sep. 64): *Tilia rubra* D. C. = *T. vulgaris* Hayne = *T. corinthiaca* « Bosc. » = *T. intermedia* Boiss. fl. Or. I. 847 [non DC. = *T. cordata* Mill. = *T. microphylla* Vent. Boiss. fl. Or. I. 846 = *T. ulmifolia* Scop.] = *T. Caucasica* Rupr. teste cl. V. Engler.

Inter Lengerud et Kaswin, prope pagum Pulardichan, in umbrosis ad rivulum (17, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 179, indetermin.).

V. 642 (Sep. 68): *Zygophyllum eurypterum* Boiss. et Buhse (1860) wird neuerdings (O. et B. Fedtschenko, consp. flor. Turk. in Beih. Bot. Centralbl. XX. 334 n. 794) mit *Z. atriplicoides* Fisch. et Mey. (1834) vereinigt. Letzteres hat die Priorität.

V. 643 (Sep. 69): Statt. (*Acer insigne*) var. *longiloba* und *obtusiloba* besser *longilobum* und *obtusilobum*.

V. 645 (Sep. 71): *Pistacia nutica* Fisch. et Mey. — Inter Kilischim et Pul-i-ambu (23, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 379, indetermin.).

V. 645 (Sep. 71): *Rhamnus Pallasii* Fisch. et Mey. — Boiss. fl. Or. II (1), 17. — Inter Diardschan et Kilischim (28, VII, 1902, cal. Julian.; leg. Alex.; n° 1005, indetermin.).

V. 645 (Sep. 71): zu ergänzen: *Rhamnus grandifolia* Fisch. et Mey. — Boiss. fl. Or. II, 22. — Ad Pulardichan (Route Lengerud-Kaswin; 17, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex., n° 182, indetermin.).

V. 650 (Sep. 76): Nach Wiener Regeln hat *Lotus Michauxianus* Ser. als Varietät des *L. Gebelia* Vent. betrachtet den Namen  $\beta$  *tomentosus* Boiss. zu führen.

V. 652 (Sep. 78): zu ergänzen: *Glycyrrhiza glabra* L.  $\beta$  *glandulifera* (W. K.) Reg. et Herd. — Boiss. fl. Or. I, 202. — In planitie inter Teheran et oppidum Demawend, praesertim ad fluv. Dschade-rud abunde (20, VII, 1902; n° 5705). — Ad Mendschil et Patschinar, 4-500 m. ubicunque divulgata (11, V, 1902; n° 5741).

V. 653 (Sep. 79): *Astragalus Asterias* Stev. ist neben *A. cruciatus* Link. als Art nicht aufrecht zu erhalten.

V. 653 (Sep. 79): *Astragalus filicaulis* Fisch. et Mey. — Die Pflanze

von Mendschil stellt die var. *agrestis* Freyn et Sint. (Bull. Herb. Boiss., 2. sér., t. IV (1904) p. 446; pro spec) dar; *O.* und *B. Fedtschenko* (Consp. fl. Turk. in Bot. Centralbl. Beih., XXIII, 342) stellen den *Freyn*'schen Namen zu den Synonymen des anscheinend in der Fruchtgrösse sehr variablen *A. filicaulis* Fisch. et Mey.

V. 755 (Sep. 84) : *Astragalus senilis* Bornm. steht mit *A. pulchellus* Boiss., den *Strauss* neuerdings vielfach aus West-Persien einsandt, nicht in näherer Verwandtschaft.

V. 755 (Sep. 84) : *Astragalus Beckii* Bornm. spec. nov. (nur Name und Abbildung!). Die Beschreibung hierzu in Mitt. d. Thür. Bot. Ver., n. F., XXIII (1908), p. 5. Die Art. von der Tracht des *A. Danicus* Retz und des *A. saxatilis* Freyn et Bornm. aus der Section *Euhypoglottis*, ist neben *A. holosemius* Bge (sect. *Malucothrix*) zu stellen.

V. 756 (Sep. 85) : Der Zeile 9 erwähnten *Veronica leucantha* Bornm. war wegen eines älteren Homonyms ein neuer Name, *V. chionantha* Bornm. (vergl. tom. VII, 1907, p. 972; sep. p. 210; tab. 9), zu geben.

V. 761 (Sep. 90) : Auch die *Pichler*'sche Pflanze des » *Astragalus Talyschensis* Bge « (Stapf, Polak. Exped. II, 67) gehört nach Revision der Exemplare zu *A. Sammamensis* Boiss. et Buhse; *A. Talyschensis* Bge gehört also nicht dem Gebiet (Gilan) an.

V. 763. (Sep. 95) Zeile 9 : Statt (*Astragalus floccosum* lies *floccosus*.

V. 766 (Sep. 95) : *Astragalus Raswendicus*. Das reiche Material, das uns von dieser Art durch Konsul *Strauss* aus West-Persien zuing, weist auf nächste Verwandtschaft mit *A. submitis* Boiss. et Hoh. hin, obwohl letztere zur Gruppe der *Subacaules* gestellt wird.

V. 849 (Sep. 109), tab. 6 : Statt (*Cicer trifoliolatus* lies *trifoliolatum*.

V. 971 Sep. 113) : Als Varietät des *Lathyrus Aphaca* L. hat *L. floribundus* Velen. den Namen var. *biflorus* Post (1896) zu führen.

Tom. VI (1906) 607 (Sep. 117) : *Cratægus lagenaria* Fisch. et Mey. — Ad Pulardichan (47, VII, 1902, cal. Julian, leg. Alex.; n° 190, indetermin.).

VI. 607 (Sep. 117) : *Hulthemia Persica* (Michx. 1786) hat *Stapf* (Polak. Exp. II, 60; 1886) zum Autor.

VI. 610 (Sep. 120) : Statt » *Potentilla sericea* L. « (Schreibfehler, bereits tom. VII, 32 in einer Fussnota darauf hingewiesen) hat es *P. multifida* L. zu heissen. *P. polyschista* Boiss. auch nach *Th. Wolf* neuerdings eine gute Art.

VI. 618 (Sep. 126) : *Agrimonia Eupatoria* L. — Ad Rescht (13, VII 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 55, indetermin.; c. fruct. mat.).

V. 765 (Sep. 131) zu ergänzen : *Eryngium cæruleum* M. B. — Boiss. fl. Or. II, 823. — Inter Rescht et Lahidschan, in arenosis secundum fluvium Sefdrud, et ad Diardschan at latus orientale montis Dschulfek (13 et 20. 1902. cal. Julian., leg. Alex., n° 76, 276 indetermin.).

VI. 765 (Sep. 131) : *Eryngium Billardieri* Laroche  $\gamma$  *meiocephalum* Boiss. (nach Wien. Reg.). — Prope Lahidschan (21, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 328, indetermin.).

VI. 766 (Sep. 132) : *Bupleurum linearifolium* DC. (nach *H. Wolf* nur Unterart des *B. exaltatum* M. B.) aus dem Gebiet (Nord-Persien) gehört der längeren Fruchtstiele halber zu var.  $\beta$  *Kotschyannum* Boiss. fl. Or. II, 850 (Diagn. I, 10 p. 29 pro spec.) e loc. class.

VI. 766 (Sept. 132) : *Reutera tragioides* Boiss. — Prope pagum Diardschan (21, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 330, indetermin.).

VI. 769 (Sept. 133) : *Pimpinella affinis* Ledeb. — Prope Enseli et Rescht (9 et 17, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 23 et 50, indetermin.). — « *P. peregrina* » in *Sintenis* exs. n° 1741 von Kisil-Arwat (Transkaspien) gehört ebenfalls zu *P. affinis* Ledeb., dagegen ist die von *Pichler* im Elburs (Karu) gesammelte in *Stapf* (Polak. Exped. II, 50) als *P. affinis* erwähnte Pflanze nach Exemplaren aus dem K. K. Botan. Institut-Wien nicht anderes als das seltene *Seseli Olivieri* Boiss., das mir auch und zwar in den Alpen zwischen Totschal und Demawend als Felsenpflanze hoher Lagen begegnete.

VI. 770 (Sep. 136) : *Peucedanum cervariifolium* C. A. Mey. — Inter Lengerud et Kaswin (21, VII, 1902; cal. Julian., leg. Alex.; n° 821, indetermin.).

VI. 770 (Sep. 136) ist einzufügen : *Cymbocarpium erythræum* (DC.) Boiss. — Boiss. fl. Or. II, 1028. — Prope Mendschil, 400 m. s. m. (10, V, 1902 legi; n° 7219, flor.).

*Cymbocarpium marginatum* Boiss. — Boiss. fl. Or. II, 1028.

Ad radices alpium Totschal. ad pagum Ferasad, 1600 m. s. m. (28, V, 1902 legi; n° 7140 c. fl. et fr.). — In planitie Teheranica, prope Schahabad. 12-1300 m. s. m. (13, V, 1902 legi, n° 7224).

Die Gattung ist für das Gebiet neu. Die Exemplare von *C. erythræum* sind dürrtig, an den kahlen, nicht absteigend behaarten Früchten aber leicht von *C. marginatum* zu unterscheiden.

VI. 773 (Sep. 139) : *Crucianella suaveolens* C. A. Mey. — Inter Lengerud et Kaswin ad pagum Diardschan (22, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 980, indetermin.).

VI. 774 (Sep. 139) nach *Asperula trichodes* ist einzureihen : *Asperula microphylla* Boiss. — Boiss. fl. Or. III, 33. — Inter Lahidschan et Kaswin in latere orientali alpium Dschulfek (loc. class.) ad rupes angustiarum supra Diardschan (20, VII, 1902, cal. Julian, leg. Alex.; n° 263, indetermin.).

VI. 775 (Sept. 141) : *Galium xylorrhizum* Boiss. et Huet hat, als eine Varietät von *G. subvelutinum* DC. (1830) betrachtet, nach Wiener Regeln var. *stenophyllum* Boiss (pro var. *G. leiophylli* in flor. Or.) zu heissen; ebenso hat statt *G. verum* L.  $\gamma$  *Ruthenicum* der Name *G. verum* L. var. *lasiocarpum* Led. einzutreten.

VI. 777 (Sep. 143) : Statt *G. humifusum* (M. B.) Stapf  $\gamma$  *Persicum* (DC. pr. sp.) lies *G. humifusum* (Willd.) Stapf (Beitr. Fl. Lyc. Car. Mesopot. I, 35, 1885; Verb. Zool. Bot. Ges. Wien XXXIX, 1889 p. 10)  $\gamma$  *stenophyllum* Boiss.

VI. 779 (Sep. 145) : *Cephalaria Kotschyi* Boiss. — Prope Kilischim (23, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex., n° 350, indetermin.).

VI. 779 (Sep. 145) : *Scabiosa Ucrainica* L. — Boiss. fl. Or. III, 139. — Inter Kilischim et Pul-i-Ambu (23, VII, 1902, cal. Julian., leg. Alex.; n° 283, indetermin.).

Tom. VII (1907) 43 (Sep. 158) : *Thevenotia*. Nach O. Kuntze Lexic. gen. phanerog. 558 (1904) ist *Thevenotia* DC. 1833 (non L. 1737) in *Thevenotula* O. Kuntze abzuändern.

VII. 222 (Sep. 172) : *Cirsium arvense* (L.) Scop. — Boiss. fl. Or. III, 553. — In ditione vulgatum ad regionem alpinam usque; ad Getschesär vallis Lur, 22-2300 m. s. m. (19, VI, 1902 legi; n° 5720).

VII. 428 (Sep. 178) lies : *Leontodon asperrimus* (Willd.) Boiss. und *L. asper* (W. K.) Poir.

VII. 778 (Sep. 192) : Statt *Erythræa pulchella* (Sw.) Fr. lies *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce; cfr. Schinz et Telling in Bull. Herb. Boiss. 1907, p. 335.

VII. 781 (Sep. 195) Zeile 11 lies : Polak. Exped. I, 28 (nicht 151). — Die in Stapf. l. c. angeführte «*Nonnea rosea* M. B. flore luteo!» gehört, wie zu erwarten war und wie auch Herr Dr. Stadlmann nach Vergleich mit meinen ebendort gesammelten Exemplaren bestätigen konnte, ebenfalls zu *Nonnea lutea* (Desr.) Rehb.; die zur sicheren Determination nötigen reifen Samen fehlten den Pichler'schen Exemplaren.

Tom. VIII (1908) p. 43 (Sep. 158) : Vor *Chardinia xeranthemoides* Dsf. hat *Ch. Orientalis* (Willd.) sub *Xeranthemo* Hayek die Priorität.

VIII. 111 (Sep. 221) ist bei *Salvia Amasiaca* Freyn et Bornm. zu ergänzen : Oest. Bot. Zeitschr. 1891 S. 58.

VIII. 552 (Sep. 242) lies : *Haussknechtii* und Haussknecht.

VIII. 826 (Sep. 272) : Statt *Bromus sterilis* K. lies *B. sterilis* L.

V. 645 (Sep. 71) *Rhamnus* : Bornm. n° 6553, 6564 (Sint exs. n° 2004, sub *R. spathulifolia* determ. Freyn) ad *Rh. Palasii* f. fol. latioribus pertinet.

## Verzeichnis der Abbildungen.

- Acantholimon Demawendicum* Bornm. sp. nov. t. VIII (1908). tab. 2.  
*Astragalus atricapillus* Bornm. sp. nov. t. V (1905) pl. 9 fig. I.  
 » *Beckii* Bornm. sp. nov. t. V (1905) pl. 8 fig. II, a, b.  
 » *heterochrous* Bornm. sp. nov. t. V (1905) pl. 9 fig. III.  
 » *rimarum* Bornm. sp. nov. t. V (1905) pl. 9 fig. II.  
 » *senilis* Bornm. sp. nov. t. V (1905) pl. 8 fig. I.  
*Cicer ervoides* (Sreb.) Fenzl. t. V (1905) pl. 6 fig. II.  
 » *trifoliolatum* Bornm. sp. nov. t. V (1905) pl. 6 fig. I.  
*Cousinia adenotricha* Bornm. sp. nov. t. VII (1907) pl. IV u. pl. III fig. II.  
 » *amplissima* Boiss. t. VII (1907) pl. III fig. V.  
 » *Assasinorum* Bornm. sp. nov. t. VII (1907) pl. V.  
 » *chamæpeucides* Bornm. sp. nov. t. VII (1907) pl. VI.  
 » *crispa* Jaub. et et Spach. t. VII (1907) pl. III fig. III.  
 » *hypochionea* Bornm. sp. nov. t. VII (1907) pl. VII fig. I.  
 » *hypoleuca* Boiss. et Ky. t. VII (1907) pl. III fig. IV.  
 » *hypopolia* Bornm. et Sint. sp. nov. t. VII (1907) pl. VII fig. IV.  
 » *hypopolia* Bornm. et Sint. var. *albiflora*  
 Bornm. et Sint. t. VII (1907) pl. VII fig. II.  
 » *Lithvinoviciana* Bornm. spec. nov. t. VII (1907) pl. VII fig. III.  
 » *pinarocephala* Boiss. β *Totschalensis*  
 Bornm. t. VII (1907) pl. III, fig. I.  
*Diplotenia cachrydifolia* Boiss. t. VIII (1908) pl. 8.  
*Erigeron Elbursensis* Boiss. t. VII (1907) pl. I fig. 3.  
 » *Hycanicus* Bornm. et Vierh. sp. nov.  
 f. *monocephalus*. t. VII (1907) pl. I fig. 1.  
 » *Hycanicus* Bornm. et Vierh. sp. nov.  
 f. *pleiocephalus*. t. VII (1907) pl. I fig. 2.

- Gypsophila modesta* Bornm. sp. nov..... t. V (1905) pl. 6 fig. III.  
*Onobrychis picta* Bornm. sp. nov..... t. V (1905) pl. 7 fig. I.  
 » *psammophila* Bornm. sp. nov..... t. V (1905) pl. 7 fig. II.  
 » *Teheranica* Bornm. sp. nov..... t. V (1905) pl. 7 fig. III.  
*Potentilla cryptophila* Bornm. sp. nov..... t. VI (1906) pl. 16.  
*Pyrethrum hololeucum* Bornm. sp. nov..... t. VII (1907) pl. II.  
*Veronica chionantha* Bornm. sp, nov..... t. VII (1907) tab. 9.

## INDEX

	Tom.	Pag.	Separat. Pag.		Tom.	Pag.	Separat. Pag.
Ranunculaceæ .	IV (1904).	1077	5	Onagrariaceæ .	VI. (1906)	617	127
Berberidaceæ .	»	1085	13	Haloragaceæ .	»	619	129
Nymphæaceæ .	»	1086	14	Cucurbitaceæ .	»	619	129
Papaveraceæ .	»	1087-88	15	Crassulaceæ .	»	619	129
»	»	1257	—	Saxifragaceæ .	»	619	129
Fumariaceæ .	»	1257	17	Hamamelidaceæ	»	765	131
Cruciferae .	»	1259-72	19	Umbelliferae .	»	765	131
»	(V. 1905)	49	—	Araliaceæ .	»	772	138
Capparidaceæ .	»	57	41	Cornaceæ .	»	772	138
Resedaceæ .	»	57	41	Caprifoliaceæ .	»	772	138
Cistaceæ .	»	58	42	Rubiaceæ .	»	773	139
Violaceæ .	»	58	42	Valerianaceæ .	»	777	143
Polygalaceæ .	»	60	44	Dipsaceæ .	»	779	145
Silenaceæ .	»	60-64	44	Compositæ-Tubulifloræ .	VII. (1907)	32-43	147
»	»	117	—	»	»	209-24	—
Alsiniaceæ .	»	122	54	»	»	425-28	—
Tamariscaceæ .	»	129	61	Compositæ-Ligulifloræ .	»	428-36	178
Hypericaceæ .	»	129	61	Campanulaceæ .	»	773	187
Malvaceæ .	»	131	63	Vacciniaceæ .	»	774	188
Tiliaceæ .	»	132	64	Primulaceæ .	»	775	189
Linaceæ .	»	132	64	Ebenaceæ .	»	776	190
»	»	639	—	Oleaceæ .	»	776	190
Oxalidaceæ .	»	640	66	Jasminaceæ .	»	777	191
Geraniaceæ .	»	640	66	Apocynaceæ .	»	777	191
Zygophyllaceæ .	»	642	68	Asclepiadaceæ .	»	777	191
Rutaceæ .	»	642	68	Gentianaceæ .	»	778	192
Sapindaceæ .	»	643	69	Convolvulaceæ .	»	779	193
Meliaceæ .	»	644	70	Borraginaceæ .	»	779-88	193
Terebinthaceæ .	»	644	70	»	»	965	—
Rhamnaceæ .	»	645	71	Solanaceæ .	»	966	204
Leguminosæ .	»	645-54	71	Scrophulariaceæ .	»	966	204
»	»	752-67	—	Orobanchaceæ .	»	975	213
»	»	837-50	—	Verbenaceæ .	»	977	215
»	»	969-72	—	Labiatae .	»	978-80	216
Rosaceæ .	VI (1906)	605	115	»	VIII. (1908)	409	219
Granataceæ .	»	617	127	Plumbaginaceæ .	»	122	232

	Tom.	Pag.	Séparat. Pag.		Tom.	Pag.	Séparat. Pag.
Plantaginacæ . . . . .	VIII. (1908)	124	234	Juncacæ . . . . .	VIII. (1908)	733	261
» » »	»	545	—	Cyperacæ . . . . .	»	733	261
Salsolacæ . . . . .	»	545	235	Graminacæ . . . . .	»	735-38	263
Amarantacæ . . . . .	»	548	238	« » »	»	821	—
Polygonacæ . . . . .	»	548	238	Coniferæ . . . . .	»	829	275
Thymelacæ . . . . .	»	551	241	Gnetacæ . . . . .	»	829	275
Elæagnacæ . . . . .	»	551	241	Filices . . . . .	»	830	276
Santalacæ . . . . .	»	552	242	Equisetacæ . . . . .	»	832	278
Loranthacæ . . . . .	»	552	242	Marsiliacæ . . . . .	»	832	278
Cytinacæ . . . . .	»	552	242	Hepaticæ . . . . .	»	833	279
Aristolochiacæ . . . . .	»	553	243	Weisiacæ . . . . .	»	834	280
Euphorbiacæ . . . . .	»	553	243	Ditrichacæ . . . . .	»	834	280
Buxacæ . . . . .	»	557	247	Pottiacæ . . . . .	»	834	280
Urticacæ . . . . .	»	557	247	Grimmiacæ . . . . .	»	835	281
Juglandacæ . . . . .	»	558	248	Funariacæ . . . . .	»	835	281
Platanacæ . . . . .	»	559	249	Bryacæ . . . . .	»	835	281
Cupuliferæ . . . . .	»	559	249	Mniacæ . . . . .	»	836	282
Betulacæ . . . . .	»	560	250	Meeseacæ . . . . .	»	836	282
» » »	»	723	—	Bartramiacæ . . . . .	»	915	283
Salicacæ . . . . .	»	723	251	Fontinalacæ . . . . .	»	915	283
Juncaginacæ . . . . .	»	725	253	Cryphacæ . . . . .	»	915	283
Potamogetonacæ . . . . .	»	725	253	Nekeracæ . . . . .	»	915	283
Aracæ . . . . .	»	725	253	Hypnacæ . . . . .	»	916	284
Typhacæ . . . . .	»	726	254	Fungi . . . . .	»	917	285
Orchidacæ . . . . .	»	726	254	—			
Iridacæ . . . . .	»	726	254	Nachträge und			
Amaryllidacæ . . . . .	»	727	255	Berichtigungen			
Colchicacæ . . . . .	»	728	256	gen . . . . .	»	923	291
Liliacæ . . . . .	»	729	257	Verzeichnis der			
Asparagacæ . . . . .	»	732	260	Abbildungen . . . . .	»	928	296
Smilacæ . . . . .	»	733	261	Index . . . . .	»	929	297
Dioscoreacæ . . . . .	»	733	261				

